



## المركز الوطني لمكافحة الأمراض National Centre for Disease Control

إدارة مكافحة الدرن والأخماج التنفسية والجذام

# اللقاح الواقي من الدرن ( السل )

## بي سي جي BCG



### النصائح اللازمة للتقليل من الأعراض الجانبية

- اترك مكان اللقاح مكشوفاً قدر الإمكان .
- لاتضع أي عقاقير طبية على التقرح الذي يظهر بعد التطعيم وان كان ضرورياً فيكتفي بوضع شاش معقم لمنع الاحتكاك بملابس الطفل .
- لا يعطى الطفل المضادات الحيوية لتخفيف مكان التورم بسبب اللقاح .
- يسمح بحمام الطفل بعد التلقيح دون قيود .

### ملاحظة :

يجب مراجعة مركز التطعيم عند ملاحظة أي أعراض مرضية ناتجة عن التطعيم .

# TB

REACH THE  
3 MILLION.

FIND. TREAT. CURE TB.

المركز الوطني لمكافحة الأمراض  
National Centre for Disease Control

إدارة مكافحة الدرن والأخماج التنفسية والجذام

مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض  
الإدارة العامة للمركز: قرجي - طرابلس ، ليبيا

info@nidcc.org.ly | 021 480 3198 | 021 480 3231  
www.nidcc.org.ly | 71171 | 021 715 3328



### الأعراض الجانبية للقاح BCG ؟

يمكن أن يسبب لقاح الدرن (السل) بعض الأعراض الجانبية ككل اللقاحات ، وأهمها ما يلي :

الأعراض الطبيعية السالبة على صحة تطبيق اللقاح و الحصول على الفائدة منه هي :

- يسبب اللقاح رد فعل في مكان الحقن على شكل تورم ، و الذي من النادر أن يتقيح (بعد أسابيع ، و يشفى عادة لـوحده خلال أسابيع أو أشهر) .
- قد تتورم الغدة المفاووية قليلاً تحت الإبط من جهة التطعيم دون ألم أو احمرار ، و تزول خلال أسابيع .
- يترك اللقاح ندبة دائمة صغيرة مكان الحقن .

هناك أعراض أخرى قليلة المشاهدة ( تحدث لطفل واحد من كل 100 إلى 1000 طفل تلقوا اللقاح ) :

- ارتفاع درجة حرارة الطفل .
- صداع و ألم الرأس .
- تورم العقدة اللمفاوية تحت الإبط لأكثر من 1 سم .
- قد تحدث أعراض جانبية وهي عموماً نادرة وتتطلب مراجعة الطبيب المختص .
- إذا حدث تورم و احمرار في الوجه ، أو في الرقبة ، طفح جلدي ، صعوبة تنفس ، و هي تظهر غالباً مباشرة عند الحقن ، يجب مراجعة مركز التطعيم عند حدوثها .

- وجود طفح جلدي معمّم عند الطفل (يجب هنا تأجيل اللقاح حتى شفاء الطفل)
- نقص المناعة عند الأطفال.
- لا يعطى للطفل الذي يتلقى مشتبطات المناعة و المعالجة الإشعاعية .
- لا يعطى للأطفال المصابين بالأورام الخبيثة .



### هل يمكن إعطاء لقاح BCG للحوامل والمرضعات؟

لا يعطى لقاح الدرن (السل) للحوامل والمرضعات عادةً، إلا إذا رأى الطبيب غير ذلك .

### هل يمكن إعطاء لقاح الدرن (السل) مع لقاحات أخرى في نفس الوقت؟

يمكن ذلك مع أي لقاح آخر ولكن في مكان مختلف من الجسم ، وينصح بعدم إعطاء أي لقاح آخر في نفس الذراع الذي تم فيه حقن الطفل بلقاح الدرن (السل).

يحقن اللقاح داخل طبقات الجلد، في الجزء الأعلى من عضلة الذراع، ولضمان الحقن في طبقات الجلد، وليس تحت الجلد، يجب توافر الشروط الآتية:

1. أن لا تزيد الزاوية بين سن الإبرة و سطح الجسم، عن 15 درجة.
2. وجود مقاومة أثناء الحقن.
3. ظهور تورم بعد حقن الجرعة .



### هل لقاح الدرن (السل) فعال؟

اللقاح فعال بنسبة عالية يحمي من الأنواع الخطيرة و يخفف من التعرض للإصابة بالدرن (السل)، و لا يفيد اللقاح في حماية المريض بعد تعرضه للمرض .

### موانع استخدام اللقاح؟

**لا يعطى اللقاح في الحالات التالية :**

- وجود حساسية لأحد مكونات اللقاح .
- ارتفاع حاد في درجة الحرارة عند الطفل (يجب هنا تأجيل اللقاح حتى شفاء الطفل )

### لماذا نتلقى لقاح الدرن (السل) الـ BCG ؟

1. لأن اللقاح يقي من الأنواع الخطيرة من المرض و يقلل من حدوته عموماً .
2. مرض الدرن (السل) أحد الأمراض المستهدفة بالتطعيم عالمياً .

### ماهو اللقاح الدرن (السل) بي سي جي BCG؟

هو عبارة عن لقاح مجفف بطريقة التجميد ويحضر من البكتيريا المسببة للمرض ( عصيات الدرن (السل) خاملة منهكة غير قادرة على إحداث المرض .

### العمر عند إعطاء اللقاح

يعطى منذ الولادة بأقسام التطعيم في المستشفيات والمراكز الصحية و يعاد إعطاء التطعيم في عمر ستة سنوات لمن لم يسبق له التطعيم .

### طريقة إعطاء الجرعة

جرعة اللقاح 0.05 مللييلتر في الجلد، للمواليد دون السنة من العمر.

جرعة اللقاح 0.1 مللييلتر في الجلد، للأطفال ذوي الأعمار من سنة فما فوق.

