



Ref. No .....

Date: / / 20

الرقم الإساري: 188/4/4

التاريخ: 20 23 / 1 / 12

**السادة المحترمون / مشرفو البرنامج الوطني للتطعيمات بالبلديات  
عن طريق: مدراء مكاتب الخدمات الصحية  
ومدراء مكاتب الرعاية الصحية الأولية بالبلديات**

الموضوع: تعميم بخصوص استخدام طعمي الجدري المائي (Chickenpox) والتهاب الكبد الفيروسي الالفي (Hepatitis A).

السلام عليكم ...

بناءً على توصيات اللجنة الاستشارية العليا للتطعيمات في اجتماعها الثالث المنعقد بتاريخ 2022/12/29 م بخصوص استخدام طعمي الجدري المائي (Chickenpox) والتهاب الكبد الفيروسي الالفي (Hepatitis A).

وبالإشارة ... إلي خطاب السيد مدير إدارة التطعيمات رقم (04) المؤرخ في 2023/01/11 م بالخصوص ..

عليه ... نفيديكم بما يلي:

أولاً: يتم البدء في استخدام طعمي الجدري المائي والتهاب الكبد الفيروسي الالفي اعتباراً من 2023/03/01 م للأطفال عند عُمر 15 شهر (أي اعتباراً من مواليد 2021/ 12 /1 م).

ثانياً: الإرشادات الفنية :-

**1- طعم الجدري المائي (Varivax) (Chickenpox)**

- شكل الطعم: بودرة مجففة تتم إذابتها بالمحلول (المذيب) الخاص بها.
- عملية الخلط: يُسحب المذيب الخاص بالطعم كاملاً و يُضاف إلى عبوة الطعم ثم يقلب حتى تتم الإذابة بشكل جيد .
- التخزين: يحفظ الطعم عند درجة حرارة من 2 إلى 8°م.
- مقدار الجرعة: 0.5 مل . وتعطى بمحقنة ذاتية العجز (AD Syringe).
- موضع الحقن: تحت الجلد Subcutaneous (SC) أعلى الكتف (منطقة العضلة الدالية Deltoid muscle)، ولا يعطى في العضل ولا في الوريد.
- موانع التطعيم:

- لا يعطى الطعم للأطفال الذين يعانون من نقص المناعة، والمصابون بمرض الدرن.
- لا يعطى الطعم للأطفال الذين حدثت لهم ردة فعل تحسسي لأي مكون من مكونات الطعم سابقاً.





Ref. No .....

Date : / / 20

الرقم الإشاري : 188 / 14 / 12

التاريخ: 20 23 / 1 / 12

- يمكن إعطاء الطعم بالتزامن مع طعوم فيروسية حية أخرى مثل المركب الفيروسي (MMR) في نفس جلسة التطعيم ، وإذا لم يتم إعطاؤه بشكل متزامن في نفس الجلسة ، يجب أن ينقضي شهر واحد على الأقل بين جرعة المركب الفيروسي وبين جرعة الجذيري المائي.

### 2- طعم التهاب الكبد الفيروسي الألفي (Hepatitis A (Vaqta)

- شكل الطعم : سائل جاهز للحقن علي أن يرح قبل الاستخدام .
- التخزين : يحفظ الطعم عند درجة حرارة من 2 إلى 8°م .
- مقدار الجرعة : 0.5 مل . وتعطى بمحقنة ذاتية العجز (AD Syringe).
- موضع الحقن : في العضل Intramuscular (IM) في الجزء الأمامي الجاني (الوحيشي) من عضلة الفخذ للطفل .
- موانع التطعيم : لا يعطى الطعم للأطفال الذين حدثت لهم ردة فعل تحسسي لأي مكون من مكونات الطعم سابقاً .
- يمكن إعطاء الطعم بالتزامن مع طعوم فيروسية حية أخرى مثل المركب الفيروسي (MMR) في نفس جلسة التطعيم .

### ملاحظات :

- الاطلاع على إرشادات الاستخدام الموضحة بالنشرة الدوائية للطعم .
- تبليغ أولياء أمور الأطفال بالتوجه إلى المراكز الصحية عند اتمام أطفالهم عُمر (15) شهر لغرض تلقي الطعم المضاد للجذيري المائي والتهاب الكبد الفيروسي الألفي .

وتقبلوا منا فائق التقدير والاحترام  
والسلام عليكم

د. حيدر مفتاح السائح  
مدير عام المركز



### صورة إلي ...

- السيد وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديـوان
- السيد مدير إدارة المتابعة بديوان رئاسة مجلس الوزراء
- السيد مدير فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طرابلس
- السيد مدير الإدارة العامة للرقابة علي القطاعات الخدمية والأمنية بهيئة الرقابة الإدارية
- السيد نائب مدير عام المركز
- السيد مدير إدارة التطعيمات
- السيد مدير مكتب التفتيش والمتابعة
- ملـف الـدورـي للـحـفـظ

كـه سـعـود أبوحمـيدـة 2023.01.11 م